



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°33 du 17 octobre 2002 - 1 page

**Colza : Aucun insecticide nécessaire****Céréales : Les premiers pucerons**

### COLZA

*Stade : Trois (B3) à huit feuilles (B8).*

#### Altises

Aucune capture cette semaine dans notre réseau. La fin du vol est proche.

*Aucune intervention nécessaire.*

#### Tenthredines

Les captures d'adultes sont pratiquement nulles et le nombre de larve limité.

*Le risque devient très faible.*

#### Pucerons

Le risque demeure seulement pour les parcelles semées mi-septembre. Mais aucune remontée des populations n'est observée.

*Aucune intervention.*

#### Charançon du bourgeon terminal

Les premières captures ont été réalisées à Domérat (1) et Montoldre (2). Le vol reste néanmoins très discret pour l'instant.

Ces dernières années, les dégâts provoqués par ce charançon ont été négligeables. La majorité des colzas étant bien développée et les captures très faibles et tardives, le risque de dégâts est très limité.

*Aucune intervention cette semaine.*

#### Phoma

Le nombre de macule est très disparate d'une parcelle à l'autre (de 0.1 taches par pieds à Domérat et Jenzat à 4 taches par pieds à Tréteau). La progression de la maladie reste néanmoins limitée.

*Seule les variétés sensibles au phoma nécessitent une protection fongicide. Préférer deux interventions à demi-dose.*

### CEREALE

*Stade : Semis à une feuille.*

#### Limaces

Les premiers dégâts ont été observés.

*Attention particulièrement aux zones mouteuses ou des dégâts ont été observés les années précédentes.*

#### Pucerons

Dans les parcelles levées, les pucerons sont arrivés. En plus des ailés, on observe déjà les premières colonies de 4 à 5 pucerons.

Les comptages de ce début de semaine relèvent un pourcentage de pieds touchés allant de 0% à Pouzy-Mezangy à 7% à Tréteau.

*Effectuez un comptage dans les parcelles levées et intervenez si plus de 10% des pieds sont porteurs d'au moins un puceron.*

#### Cicadelles

Dans la région, quatre pièges ont été mis en place (Tréteau, Loriges, Saulzet et Pérignat/Allier). Installés jusque là dans des repousses, ils ont permis de capturer un nombre important de cicadelles.

|          | Semaine 40 |     | Semaine 41 |     |
|----------|------------|-----|------------|-----|
|          | Cica       | WDV | Cica       | WDV |
| Tréteau  | 43         | +++ | 30         | -   |
| Loriges  | 41         | -   | 26         | -   |
| Saulzet  | 51         | -   | 26         | -   |
| Pérignat | 21         | -   | 14         | -   |

Cica = nombre de cicadelles piégées

WDV = Présence (+++) ou absence (-) du virus des pieds chétifs

*Surveillez attentivement les parcelles bien exposées dans les sols argilo-calcaires.*

Service Régional de  
la Protection des  
Végétaux  
Site de Marmilhat BP 45  
63370 LEMPDES  
Tél. 04.73.42.14.83  
Fax 04.73.42.16.76  
www.srpv-auvergne.com

Imprimé à la Station  
d'Avertissements  
Agricoles de la DRAF  
AUVERGNE

Le Directeur gérant :  
D. DIDELOT

Publication périodique  
C.P.A.P n°2315AD  
ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 55 €  
Fax : 50 €  
Internet : 45 €